

# Conozca sus Opciones de Tratamiento para COVID-19

Ahora hay más opciones disponibles para el tratamiento de COVID-19. Los tratamientos pueden prevenir la hospitalización y la muerte de las personas con mayor riesgo. **Hable con su proveedor de atención médica** sobre las opciones de tratamiento si está en riesgo de una enfermedad grave y está interesado en un tratamiento preventivo O si está en riesgo y su resultado de la prueba de COVID-19 es positivo.

Los tratamientos no sustituyen a la vacunación. La vacunación sigue siendo la forma más segura y eficaz de protegerse contra el COVID-19. **Los tratamientos deben comenzar temprano, así que no demore en hacerse la prueba.** Aquí hay información sobre 3 tratamientos disponibles para COVID-19.

	Paxlovid	Molnupiravir	Remdesivir
¿Quién es elegible?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 años y mayores</li> <li>• Personas con COVID</li> </ul> <p><b>Y</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un sistema inmunológico debilitado <b>O</b> con mayor riesgo de enfermedad grave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 años y mayores</li> <li>• Personas con COVID con mayor riesgo de enfermedad grave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adultos y niños que pesan más de 3.5 kg (8 libras)</li> <li>• Pacientes <b>aun no hospitalizados</b> con COVID-19</li> </ul>
¿Cuándo se debe iniciar?	Dentro de los <b>5 días</b> desde el inicio de los síntomas	Dentro de los <b>5 días</b> desde el inicio de los síntomas	Dentro de los <b>7 días</b> desde el inicio de los síntomas
Como se administra?	<b>Pastillas</b> tomadas durante 5 días	<b>Pastillas</b> tomadas durante 5 días	Una vez al día durante 3 días de <b>Infusión intravenosa (IV)</b>
¿Donde puede ser dado?	<b>En Casa</b>	<b>En Casa</b>	<b>Sitio de infusión médica</b>