

Dosis de Refuerzo vs. Dosis Adicional

¿Cuál es la diferencia?

Las vacunas son la mejor protección contra una enfermedad grave, hospitalización y muerte causada por COVID-19. Las dosis de refuerzo y dosis adicionales son importante y es útil saber la diferencia entre las dos dosis.

Dosis de Refuerzo

Dosis Adicional

¿Por qué es importante?

Se administra cuando la respuesta del inmune a la primera vacunación podría haber disminuido con el tiempo.

Se administra a personas con sistemas inmunitarios debilitados que no han respondido completamente a las primeras dosis.

¿Quién es elegible?

Todas las personas de **12 años y mayores**.

Personas **5 años y mayores** que hayan completado la serie de dos dosis de Pfizer o Moderna Y tengan un **sistema inmunológico moderadamente o gravemente comprometido**.

La vacuna Johnson & Johnson aún no está aprobada como dosis adicional.

Las condiciones y tratamientos incluyen:

- Tratamiento activo del cáncer para tumores o cánceres de la sangre
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave
- Trasplante de órganos sólidos y está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico
- Infección por VIH avanzada o no tratada
- Trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico
- Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas



¿Cuándo se puede administrar?

5 meses después de recibir la primera serie de dos dosis de **Pfizer o Moderna**

28 días después de recibir la primera serie de dos dosis de Pfizer para personas edades 5-17 y Pfizer o Moderna para personas de 18 años y mayores.

2 meses después de recibir la vacuna **Johnson & Johnson**

Hable con su médico para ver si recibir una dosis adicional es apropiado para usted.

Las personas de 18 años y mayores pueden elegir qué vacuna recibir como vacuna de refuerzo. Solo Pfizer está aprobado para jóvenes de 12 a 17 años.